











Difesa del melo in agric. biologica - Carpocapsa

Fase/periodo	Avversità	Prodotto	Dose	Note
aprile		Confusione sessuale		Si può abbinare alla confusione della <i>Cydia molesta</i>
Maggio		Granulo Virus (Madex Top opp. Madex Twin)	100 ml/ha	In caso di forte presenza ridurre la velocità di avanzamento a 4 km/ora
Maggio		Spinosad (Laser) + Olio minerale estivo	225 gr/ha + 2000 gr/ha	Il Laser andrebbe a 450 gr/ha per 3 volte, così possiamo aumentare il numero degli interventi
Settembre/ Ottobre		Nematode (Nemapom)	1,5 mld/ha	



Difesa del melo in agric. biologica - Ticchiolatura (1)

Fase/periodo	Avversità	Prodotto	Dose	Note
Gennaio		Poltiglia bordolese	500 gr/q.le	
Orecchiette di topo		Poltiglia bordolese + zolfo bagnabile	200-300 gr/q.le + 200 gr/q.le	Preventivo fino a fioritura (anche per Oidio)
Fioritura		Polisolfuro di calcio opp. Thiopron	1500 gr/q.le opp. 300-400 gr/q.le	(anche per Oidio)





Difesa del melo in agric. biologica – Ticchiolatura (2)

Fase/periodo	Avversità	Prodotto	Dose	Note
Dopo la fioritura		Thiopron + Poltiglia dispers	300-400 gr/q.le + 50 gr./q.le	Preventivo fino a 30-40 mm di acqua. Controllare accrescimento fogliare
Dopo la fioritura		Polisolfuro di calcio	1500- 2000 gr/q.le	Trattamento tempestivo a foglia bagnata. Fino a 300°/ora (15 ° x 20 ore)
Caduta foglie		Poltiglia bordolese	500 gr/q.le	Se a giugno non si sono verificate infezioni, diradare gli interventi




Difesa del melo in agric. biologica - Afidi

Fase/periodo	Avversità	Prodotto	Dose	Note
Febbraio	Afide lanigero 	Olio bianco, opp. Polithiol	3000 gr/hl 5000 gr/hl	(anche per Cocciniglie)
Bottoni fiorali	Afide grigio 	Neem (azadiractina) + Amminoacidi, oppure Alghe brune		Molti prodotti a disposizione, vedere le dosi in etichetta
Caduta petali	Afide grigio	Ripetere Neem (come sopra)		

Difesa del melo in agric. biologica – varie (1)

Fase/periodo	Avversità	Prodotto	Dose	Note
Gemma ingrossata	Cocciniglia 	Olio bianco invernale	2-3 L/hl	
In vegetazione	Dopo qualsiasi ferita 	Propoli + Alghe brune	200-300 gr/hl + 50-100 gr/hl	Ottimo cicatrizzante
Dopo la fioritura	Butteratura amara 	Calcio	4-8 interventi	Vedere dosi in etichetta
Marzo/Aprile	Ricamatori – (Eulia) 	Posizionare le trappole – Bacillus t.	100 gr/hl	

Difesa del melo in agric. Biologica – varie (2)

Fase/periodo	Avversità	Prodotto	Dose	Note
Aprile	Cydia molesta 	Confusione sessuale		Si può abbinare alla confusione della Carpocapsa
Maggio	Zeurera 	Confusione sessuale oppure Trappole per cattura massale		
		Polisolfuro di calcio oppure Olio minerale		Cocciniglia pseudococcus comstoki